

**AMPROSID**  
**Otopina za peroralnu uporabu za tovne piliće i nesilice**

**1. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE VMP-a U PROMET I NOSITELJA ODOBRENJA ZA PROIZVODNJU ODGOVORNOG ZA IZDAVANJE PROIZVODNE SERIJE**

Chemifarma S.p.A. - via Don Eugenio Servadei, 16 - 47122 Forlì (Italy).

**2. NAZIV VETERINARSKO-MEDICINSKOG PROIZVODA**  
**AMPROSID** Otopina za peroralnu uporabu za tovne piliće i nesilice.

**3. IZJAVA O DJELATNOJ(IM) I DRUGIM TVARIMA**

*Djelatne tvari:*

amprolijev hidroklorid mg 250

*Pomoćne tvari:* do ml 1,00

**4. INDIKACIJA(E)**

Prevenција i liječenje kokcidioze što je uzrokuju *E. Tenella* i *E. Necatrix*.

**5. KONTRAINDIKACIJE**

Nema.

**6. NUSPOJAVE**

Nisu poznate.

**7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA**

Tovni pilići i nesilice.

**8. DOZE ZA SVAKU CILJNU VRSTU ŽIVOTINJA, NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE**

Preparak se mora pažljivo razrijediti u vodi za piće prema uputama veterinarara.

Tovni pilići: u vodi za piće 2.0 ml/litra vode za piće što je jednako 500 mg djelatne tvari/litra (jednako je 6.0 - 35 mg djelatne tvari/kg t.m.), tijekom 7 dana.

Nesilice: u vodi za piće 0.24 - 1.0 ml/litra vode za piće što je jednako 60 - 250 mg djelatne tvari/litra (jednako je 6.0 - 35 mg djelatne tvari/kg t.m.), tijekom 7 dana.

**9. KARENCIJA**

Meso i jestive iznutrice: 0 dana.

Jaja: 0 dana.

## **10. POSEBNE MJERE OPREZA ZA ČUVANJE**

Čuvati na hladnom i tamnom mjestu.

Rok valjanosti nakon prvog otvaranja unutarnjeg pakovanja: 3 mjeseca.

Rok valjanosti pripremljene otopine prema uputama: 12 sati.

## **11. POSEBNE MJERE OPREZA PRI PRIMJENI**

### ***Posebne mjere opreza pri primjeni kod životinja***

Pripravak se mora pažljivo razrijediti u vodi za piće prema uputama veterinara.

Svježa otopina VMP-a u vodi za piće mora se pripremati svakih 12 sati.

Ne smije se prekoračiti preporučena doza izražena u mg/kg t.m./dan.

### ***Posebne mjere opreza koje mora poduzeti osoba koja primjenjuje VMP kod životinja:***

Izbjegavati neposredan kontakt s proizvodom.

### ***Primjena tijekom gravidnosti, laktacije ili nesenja***

Ne smije se primjenjivati tijekom gravidnosti i laktacije. Pripravak se može primjenjivati tijekom nesenja.

### ***Interakcije***

Ne primjenjivati istovremeno s vitaminom B1.

### ***Inkompatibilnost***

Ne primjenjivati u vodi bogatoj kalcijevim ionima.

## **12. POSEBNE MJERE PREDOSTROŽNOSTI ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG VMP-A I OTPADNOG MATERIJALA, AKO GA IMA**

Postupati u skladu s važećim zakonskim propisima.

Samo za životinje.

Čuvati van dohvata i pogleda djece.

Izdaje se na veterinarski recept.